Додаток 2
до реєстраційного посвідчення АА-06176-01-15

24. 11. 2020

Стафак® 110
(порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис
Порошок зелено-коричневого кольору.
Склад
1 кг препарату містить діючу речовину:
вірджиніаміцин – 110 г.
Допоміжні речовини: карбоксиметилцелюлоза, олія мінеральна, кальцію карбонат.
Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QD06AX10 – Вірджиніаміцин.

Вірджиніаміцин належить до антибактеріальних препаратів групи стрептограмінів. Він діє бактеріостатично проти грампозитивних *(Clostridium perfringens, Staphylococcus spp., Bacillus spp.)* мікроорганізмів. Вірджиніаміцин складається з двох компонентів – фракція М (72 %) і фракція S (28 %).

Механізм дії вірджиніаміцину полягає у гальмуванні синтезу білка в клітинах чутливих мікроорганізмів, порушуючи трансляцію РНК. Зв'язування стрептограмінів з 50S-субодиницею можливе на будь-якій стадії рибосомального циклу. У результаті відбувається гальмування процесу формування та нарощування пептидного ланцюга, що призводить до загибелі клітини.

При пероральному застосуванні вірджиніаміцин не всмоктується з травного каналу і його антибактеріальна дія обмежується виключно ним. У травному каналі вірджиніаміцин не зазнає впливу травних ферментів, завдяки чому досягається його висока концентрація, що сприяє тривалій антимікробній дії.

Вірджиніаміцин не накопичується в органах і тканинах. Концентрації його в плазмі крові відсутні. Вірджиніаміцин з організму виводиться в незміненому вигляді з фекаліями.
Застосування
Лікування курчат-бройлерів, хворих на некротичний ентерит, що спричинений мікроорганізмами, чутливими до вірджиніаміцину.
Дозування
Перорально у дозі 180-200 г препарату на 1000 кг готового корму (20-22 г вірджиніаміцину на 1000 кг готового корму) або 1 мг препарату на 1 кг маси тіла щодобово протягом 5-7 діб.
За необхідності курс лікування можна повторити.
Протипоказання
Підвищена чутливість до вірджиніаміцину.
Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких використовують для споживання людям.
Застереження
Особливі застереження при використанні
Відсутні.
Використання під час вагітності, лактації, несучості
Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких використовують для споживання людям.
Не рекомендують застосовувати племінній птиці.
Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії
Дозволяється застосування препарату одночасно з іншими антибактеріальними засобами, а також одночасно з кокцидіостатиками та нестероїдними протизапальними засобами.
Період виведення (каренції)
Нуль діб.
Форма випуску
Паперові пакети з пароізоляційним поліетиленовим бар'єром по 25 кг.
Зберігання
Сухе темне, не доступне для дітей місце за температури від мінус 25°С до 25°С.

24. 11. 2020

Термін придатності - 3 роки.

Після першого відкриття упаковки препарат застосовують протягом 6 місяців за умови зберігання у сухому, темному місці за температури від мінус 25 °С до 25 °С.

Корм з препаратом використовують протягом 3 місяців.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Файбро Енімал Хелс Корпорейшн
Гленпоінт Сентер Іст, поверх 3
300 Френк В.Бер Блвд., офіс 21
Тінек, Нью Джерсі, 07666-6712, США

Phibro Animal Health Corporation
Glenpointe Centre East, Floor 3
300 Frank W. Burr Blvd., Suite 21
Teaneck, New Jersey, 0766-6712, USA

Виробник готового продукту

Рідлі ЮЕсЕй, Інк.
1609 1-ша Авеню
Мендота, Іллінойс
61342-1366, США

Ridley USA, Inc.
1609 1st Avenue
Mendota, Illinois
61342-1366, USA