

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Колібін РК Нео, Kolibin RC Neo – вакцина інактивована проти колібактеріозу, ротавірусної та коронавірусної інфекцій великої рогатої худоби.

Склад

Одна доза (2 мл) вакцини містить:

Діючі речовини:

ротавірус ВРХ, штам ТМ-91 (MSV-Bio-30), інактивований	RP ≥ 1*
коронавірус ВРХ, штам С-197 (MSV-Bio-21), інактивований	RP ≥ 1*
<i>Escherichia coli</i> , ентеропатогенні штами, інактивовані	RP ≥ 1*
штам MSLB 3014 (серотип O8:K35, K99)	
штам MSLB 3015 (серотип O9:K35, K99)	
штам MSLB 3016 (серотип O101:K30, K99)	

*Відносна активність – порівняння титру антитіл у щеплених морських свинок з мінімальним титром референтної вакцини

Допоміжні речовини:

консервант: тіомерсал	0,085-0,115 мг/мл
інактивант: розчин формальдегіду 35 %	≤ 1 мг/мл
ад'ювант: монтанід ISA 70	до 2 мл

Фармацевтична форма

Емульсія.

Імунобіологічні властивості

Вакцина викликає утворення специфічних антитіл проти вірусних та бактеріальних антигенів, що входять до складу вакцини (бактерій *Escherichia coli*, ротавірусу та коронавірусу ВРХ).

Пасивний імунітет у телят розвивається з початку вживання молозива, отриманого від щеплених корів, і триває протягом періоду годування. Імунітет у телят, які вживають молозиво природним шляхом від вакцинованих корів, триває перші 2-4 тижні життя.

Вид тварин

Велика рогата худоба.

Показання до застосування

Для активної імунізації нетелей та тільних корів з метою передачі телятам пасивного імунітету проти захворювань шлунково-кишкового тракту, викликаних бактеріями *Escherichia coli*, ротавірусом та коронавірусом ВРХ.

Протипоказання

Не вакцинувати хворих тварин.

Застереження при застосуванні

Перед застосуванням ретельно струсити вміст флакону та підігріти до температури (15-25)°С. Вакцинувати тільки клінічно здорових тварин. Слід вакцинувати все батьківське поголів'я тварин. Телятам необхідно давати достатню кількість молозива не пізніше, ніж через шість годин після народження.

Взаємодія з іншими засобами

Інформація стосовно нешкідливості та ефективності застосування вакцини з іншими ветеринарними препаратами відсутня. Рішення щодо введення засобу з іншими ветеринарними препаратами приймає безпосередньо лікар ветеринарної медицини.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Вакцина призначена для застосування вагітним тваринам.

Спосіб застосування та дози

Вакцину застосовують у дозі 2 мл на тварину шляхом внутрішньом'язових ін'єкцій у м'язи стегна. Тільних корів та нетелей вакцинують двічі з інтервалом 21 день, а саме за 7-5 тижнів та 4-

2 тижні перед очікуваним отелом.

Подальші вакцинації проводять одноразово за 4-2 тижні перед кожним наступним отелом.

Годівля молозивом:

Для захисту від інфікування в перші 2-3 тижні життя телятам необхідно вигодувати достатню кількість молозива, отриманого від щеплених корів. Молозиво (молоко) збирають за перші 6-8 доїнь та зберігають у замороженому або охолодженому вигляді. Охолоджене молозиво (молоко) зберігають щонайдовше 14 днів при температурі від 2°C до 8°C. В залежності від маси тіла телят, щоденна норма молозива (молока) становить 2,5-3,5 л на тварину впродовж перших 2 тижнів життя.

Побічні ефекти

У рідких випадках після застосування вакцини можуть спостерігатися алергічні реакції. У разі прояву підвищеної індивідуальної чутливості застосовують антигістамінні препарати.

Період виведення (каренції)

Нуль днів.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

Уникати аутовакцинації. У разі випадкового введення вакцини необхідно терміново звернутися до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний ветеринарний препарат або порожні флакони повинні бути утилізовані відповідно до місцевих вимог.

Термін придатності

2 роки. Вакцину з відкритого флакону використати впродовж 10 годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому темному місці при температурі від 2 °C до 8 °C. Не заморожувати!

Упаковка

Вакцина випускається у скляних флаконах ємкістю 20 мл, 50 мл, 100 мл або пластикових флаконах ємкістю 10 мл, 100 мл, 250 мл. Флакони з вакциною, що вкриті гумовим корком, придатним для проколювання, та запаяні алюмінієвою кришкою, поміщені у картонні коробки або пластикові коробки з лунками.

Розмір пакування:

Пластикові коробки з 10 або 20 лунками:

2 x 2 мл (2 дози вакцини), 10 x 2 мл (10 доз вакцини), 20 x 2 мл (20 доз вакцини), 5 x 4 мл (10 доз вакцини), 10 x 4 мл (20 доз вакцини), 5 x 10 мл (25 доз вакцини), 10 x 10 мл (50 доз вакцини).
Картонні коробки: 1 x 4 мл (2 дози вакцини), 1 x 10 мл (5 доз вакцини), 1 x 20 мл (10 доз вакцини), 5 x 20 мл (50 доз вакцини), 10 x 20 мл (100 доз вакцини), 1 x 50 мл (25 доз вакцини), 12 x 50 мл (300 доз вакцини), 24 x 50 мл (600 доз вакцини), 1 x 100 мл (50 доз вакцини), 12 x 100 мл (600 доз вакцини), 20 x 100 мл (1000 доз вакцини), 1 x 250 мл (125 доз вакцини), 12 x 250 мл (1500 доз вакцини), 20 x 250 мл (2500 доз вакцини).

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Акціонерне товариство «Біовета», Коменського 212, 683 23, Івановіце на Гане, Чеська Республіка.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення реклаमाцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2, три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.