

## Листівка-вкладка

### Назва ветеринарного препарату

ІЛТ, ILT – вакцина жива проти інфекційного ларинготрахеїту курей.

### Склад

Вакцина містить:

вірус інфекційного ларинготрахеїту, штам Samberg

–  $10^{3,3}$  ЕІД<sub>50</sub>/дозу

Допоміжні речовини:

стабілізатор: знежирене молоко

– 0,03 г/флакон

стабілізатор: лактоза

– 0,09 г/флакон

стабілізатор: натрію глутамат

– 0,03 г/флакон

консервант: гентаміцин

– 0,01 мг/флакон

ідентифікатор: брильянт крезиловий блакитний

– 0,03 мл/флакон

1 мл розчинника (деіонізованої води) містить:

динатрій гідрогенфосфат

– 0,00444 мг

натрію хлорид

– 0,0068 мг

фенол червоний

– 9,8 мг

гліцерин

– 0,3088 мг

мононатрію дигідроген фосфат

– 0,00045 мг

### Фармацевтична форма

Ліофілізат і розчинник.

### Імунобіологічні властивості

Вакцина забезпечує активний імунітет проти інфекційного ларинготрахеїту курей. Стійкий імунітет формується через 2 тижні після вакцинації.

### Вид тварин

Кури.

### Показання до застосування

Для профілактичної вакцинації курей-несучок, бройлерів, батьківського поголів'я яєчної птиці та бройлерів проти інфекційного ларинготрахеїту, починаючи з 3-тижневого віку.

### Протипоказання

Не вакцинувати хвору птицю. Не допускати нагрівання вакцини. Не зменшувати дозу вакцини.

### Застереження при застосуванні

Розчинену вакцину використати одразу.

### Взаємодія з іншими засобами

Немає.

### Особливі вказівки при несучості

Не застосовувати.

### Спосіб застосування та дози

Вакцину застосовують, починаючи з 3-тижневого віку, інтраокулярним методом або за допомогою клоачної щітки. Бройлерну птицю щеплюють одноразово. За необхідності яєчну птицю, батьківське поголів'я бролерів та курей-несучок ревакцинують до початку періоду несучості або під час линьки.

### Інтраокулярний метод:

Вміст одного флакону розчинити у холодній кип'яченій або дистильованій воді – 1000 доз вакцини розчиняють у 30-50 мл води (точна кількість води залежить від типу застосованої крапельниці).

Тримаючи птаха в одній руці, підставити його під крапельницю, щоб в око потрапила одна крапля. Після розчинення вакцину слід використати одразу.

### Вакцинація за допомогою клоачної щітки:

Вміст одного флакону змішати з розчинником, що додається, та обережно збовтати для забезпечення однорідної дисперсії вакцини.

Тримаючи птаха вниз головою між колінами, однією рукою розтягнути клоаку, а другою рукою за допомогою щітки нанести вакцину на слизову оболонку клоаки. Щітку необхідно занурювати у вакцину після кожного нанесення.

### **Побічні ефекти**

Після введення вакцини інтраокулярним методом може з'явитись тимчасовий кон'юнктивіт.

### **Період виведення (каренції)**

Нуль днів.

### **Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП**

Дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами.

### **Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації**

Невикористаний і протермінований препарат або використані порожні флакони повинні бути утилізовані шляхом кип'ятіння протягом 30 хвилин.

### **Термін придатності**

18 місяців. Розчинену вакцину використати одразу.

### **Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°C до 8°C.

### **Упаковка**

До складу упакування входять флакони з вакциною, флакони з розчинником та аплікатор(клоачна щітка або крапельниця).

Вакцина випускається у скляних флаконах ємкістю 5 мл, що містять 500 або 1000 доз вакцини. Флакони з вакциною вкриті гумовим корком, придатним для проколювання, та герметично вкриті алюмінієвими кришками.

Розчинник випускається у пластикових або скляних флаконах по 500 або 1000 доз розчинника у кожному флаконі.

### **Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника**

АБІК Біолоджикал Лабораторіз Лтд., а/с 489, Вестерн Індастріал Зон, Бейт Шемеш, 99100, Ізраїль.

### **Правила відпуску**

За рецептом.

### **Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2, три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.