

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Нектів Форте, Nectiv Forte – вакцина інактивована масляна емульгована проти ньюкаслської хвороби.

Склад

Одна доза (0,1 мл) вакцини містить:

вірус ньюкаслської хвороби, штам V.H. – не менше $10^{8,4}$ ЕІД₅₀/дозу

Допоміжні речовини:

Ад'ювант: рідкий парафін – 0,142 мл/дозу

Емульгатор: олеат сорбіту – 0,006 мл/дозу

Емульгатор: полісорбат 80 – 0,002 мл/дозу

Фармацевтична форма

Водно-масляна емульсія.

Імунобіологічні властивості

Вакцина формує у птиці активний імунітет проти ньюкаслської хвороби. Імунітет формується протягом 21 дня після вакцинації і триває протягом періоду вирощування.

Вид тварин

Індики, кури.

Показання до застосування

Для профілактичної вакцинації індиків, бройлерної та яєчної птиці, батьківського поголів'я бройлерів і курей-несучок проти ньюкаслської хвороби, починаючи з добового віку.

Протипоказання

Не вакцинувати хвору птицю.

Застереження при застосуванні

Перед застосуванням добре струсити вміст флакону і підігріти до 20-25°C. Не застосовувати нагрівальні пристрої для підігріву вакцини. Не застосовувати перегріту вакцину. Обладнання для вакцинації необхідно попередньо очистити і стерилізувати.

Взаємодія з іншими засобами

Інформація стосовно нешкідливості та ефективності застосування вакцини з іншими ветеринарними препаратами відсутня. Рішення щодо введення засобу з іншими ветеринарними препаратами приймає безпосередньо лікар ветеринарної медицини.

Особливі вказівки при несучості

Не застосовувати за 4 тижні до початку та під час несучості.

Спосіб застосування та дози

Вакцину вводять птахам з першої доби життя шляхом підшкірної або внутрішньом'язової ін'єкцій в область грудних м'язів. Рекомендований об'єм дози для птиці у різному віці:

1-7 днів життя – 0,1-0,2 мл/голову

7-21 днів життя – 0,2-0,3 мл/голову

21 день життя і старше – 0,2-0,5 мл/голову

В залежності від віку птиці для ін'єкції рекомендується використовувати голку 1/4" (16-20 г). Після кожних 800 ін'єкцій рекомендується робити заміну голки.

Побічні ефекти

Відсутні.

Період виведення (каренції)

Не вакцинувати птицю за 21 день до забою.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами. Уникати аутовакцинації. У разі випадкового введення вакцини необхідно терміново звернутися до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВПІ, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат або використані порожні флакони повинні бути утилізовані згідно місцевих вимог.

Термін придатності

27 місяців. Вакцину з відкритого флакону використати протягом 2-3 годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому темному, недоступному для дітей місці за температурі від 2°C до 8°C.

Не заморожувати!

Упаковка

Пластикові флакони ємкістю 500 мл, що містять 1000-5000 доз. Флакони з вакциною герметично закриті гумовим корком, придатним для проколювання, та завальцьовані алюмінієвими ковпачками. Флакони з вакциною поміщені у картонну коробку.

Поліолефінові пакети ємкістю 500 мл, що містять 1000-5000 доз, 1000 мл, що містять 2000-10000 доз, або 2000 мл, що містять 4000-20000 доз. Пакети з вакциною закриті гумовими клапанами та укупорені поліолефіновими кришками.

На кожній упаковці прикріплена затверджена етикетка.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

АБІК Біолоджикал Лабораторіз Лтд., а/с 489, Вестерн Індастріал Зоун, Бейт Шемеш, 99100, Ізраїль.

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2, три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.