

### Листівка-вкладка

#### Назва ветеринарного препарату

Фоул Покс, Fowl Pox – вакцина жива проти віспи птиці.

#### Склад

Одна доза вакцини містить:

вірус віспи, штам Komarov

– не менше  $10^3$  ЕІД<sub>50</sub>

Допоміжні речовини:

стабілізатор: знежирене молоко

– 0,056 мг

стабілізатор: лактоза

– 0,168 мг

стабілізатор: натрію глутамат

– 0,056 мг

консервант: гентаміцин

– 0,0000268 мг

1 мл розчинника (деіонізованої води) містить:

динатрій гідрогенфосфат

– 4,52 мг

натрію хлорид

– 7 мг

фенол червоний

– 0,002 мл

гліцерин

– 0,2625 мл

мононатрію дигідроген фосфат

– 0,442 мг

#### Фармацевтична форма

Ліофілізат і розчинник у формі розчину.

#### Імунобіологічні властивості

Вакцина забезпечує активний імунітет проти віспи птиці. Стійкий імунітет формується через 3-4 тижні після вакцинації.

#### Вид тварин

Кури.

#### Показання до застосування

Для профілактичної вакцинації курей-несучок, племінних бройлерів та батьківського поголів'я яєчної птиці проти віспи, починаючи з добового віку.

#### Протипоказання

Не вакцинувати хвору птицю. Не допускати нагрівання вакцини. Не зменшувати дозу вакцини.

#### Застереження при застосуванні

Розчинену вакцину використати одразу.

#### Взаємодія з іншими засобами

Немає.

#### Особливі вказівки при несучості

Не застосовувати.

#### Спосіб застосування та дози

Вакцину застосовують, починаючи з добового віку, методом проколювання шкіри за допомогою голки-аплікатора, що додається.

Вміст одного флакону змішати з розчинником та обережно збовтати для забезпечення однорідної дисперсії вакцини. Добовим курчатам вакцину вводять у складку шкіри з внутрішньої сторони стегна, для старшої птиці – у нижню частину перетинки крила. Голку-аплікатор необхідно занурювати у вакцину після кожного проколювання.

У рідких випадках в залежності від епізоотичної ситуації, курей ревакцинують через 3 місяці після первинної вакцинації.

#### Ефективність вакцинації:

Перевірку ефективності вакцинації проводять через 5 днів після вакцинації добових курчат та через 8-10 днів після вакцинації старшої птиці. Вакцинація вважається ефективною, якщо у курчат, щеплених у добовому віці, у місці введення вакцини наявна припухлість зернистої консистенції, а у старшої птиці – вкрита коркою віспина.

Відсутність цих ознак указує на те, що щеплення птиці було проведено некоректно. У такому випадку, курей вакцинують повторно.

**Побічні ефекти**

Відсутні.

**Період виведення (каренції)**

Нуль днів.

**Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП**

Дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами.

**Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації**

Невикористаний і протермінований препарат або використані порожні флакони повинні бути утилізовані шляхом кип'ятіння протягом 30 хвилин.

**Термін придатності**

18 місяців. Розчинену вакцину використати одразу.

**Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°C до 8°C.

**Упаковка**

До складу упакування входять флакони з вакциною, флакони з розчинником та голки-аплікатор.

Вакцина випускається у скляних флаконах ємкістю 5 мл, що містять 500, 1000 або 2000 доз вакцини.

Розчинник випускається у скляних флаконах ємкістю 5 мл або 8 мл, що містять 500, 1000 або 2000 доз розчинника.

Флакони з вакциною та розчинником вкриті гумовим корком, придатним для проколювання, та герметично вкриті алюмінієвими кришками.

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника**

АБІК Біолоджикал Лабораторіз Лтд., вул.Хамелача 3, Вест Індастріал Зоун, Бейт-Шемеш 9905503, Ізраїль.

**Правила відпуску**

За рецептом.

**Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2, три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.