Державний комітет ветеринарної медицини України
Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів
Ідентифікаційний код 19024865
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТУ

Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00317-02-11
від 06.04.2016

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату
Боррелім 3, Borrelym 3 – вакцина інактивована проти бореліозу собак, котів і коней.

Склад
1 мл (одна доза) вакцини містить:
Активнодіючі речовини:

Borrelia burgdorferi MSLB 8014	RP ≥ 1*
Borrelia garinii MSLB 1004	RP ≥ 1*
Borrelia afzelii MSLB 1003	RP ≥ 1*

* Відносна активність (визначається методом ІФА) – порівняння титру антитіл у щеплених мишей з титром референтної сироватки, яка пройшла контрольні випробування на цільових видах тварин

Допоміжні речовини:

ад'ювант: алюмінію гідроксид	1,8-2,2 мг
консервант: формальдегід	макс. 0,5 мг
буферний розчин	до 1 мл

Фармацевтична форма
Суспензія.

Імунобіологічні властивості
У щепленої тварини формується стійкий імунітет через 1 місяць після курсу первинної вакцинації, що триває протягом 1 року. Для підтримання імунітету рекомендується щорічна ревакцинація.

Вид тварин
Собаки, коти, коні.

Показання до застосування
Для профілактичної вакцинації собак, котів і коней проти бореліозу, починаючи з 12-тижневого віку.

Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати при загальному підвищенні температури. Не застосовувати при симптомах бореліозу.

Застереження при застосуванні
Перед застосуванням вміст флакону підігріти до кімнатної температури (15-20)°С та ретельно збовтати.

Взаємодія з іншими засобами
Не застосовувати з іншими ветеринарними препаратами.

Особливі вказівки при вагітності, лактації
Не встановлено.

Спосіб застосування та дози
Вакцинують тварин, починаючи з 12-тижневого віку в дозі 1 мл.
Курс первинної вакцинації: по одній дозі вакцини двічі з інтервалом 3 тижні.
Ревакцинація: одна доза вакцини щорічно.
Для підтримання імунітету рекомендується щорічна ревакцинація одноразовим щепленням.
Собаки, коти: підшкірно в область за лопатками.
Коні: внутрішньом'язово, у м'язи задніх кінцівок.
Тварин рекомендується щеплювати у період з листопада до березня.

Побічні ефекти
У місці застосування вакцини можуть з'явитися місцеві реакції у вигляді припухлості розміром 2-7 мм, які зникають самі по собі протягом 5 днів. Можливе тимчасове підвищення температури тіла максимум на 1,5°С. У поодиноких випадках можуть спостерігатися алергічні реакції.

ЕВРОВЕТ

Державний комітет ветеринарної медицини України
Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів
Ідентифікаційний код 19024865
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТУ

Період виведення (каренції)
Нуль днів.
Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП
Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами.
Уникати аутовакцинації. У разі випадкового введення вакцини необхідно терміново звернутися до лікаря.
Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації
Невикористаний і протермінований препарат або використані порожні флакони повинні бути утилізовані відповідно до місцевих вимог.
Термін придатності
2 роки. Відкритий флакон із вакциною повинен бути використаний одразу.
Умови зберігання і транспортування
Зберігати в сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 2°С до 8°С.
Упаковка
Вакцина випускається у скляних флаконах, закритих гумовою пробкою для проколювання та запаяних алюмінієвою кришкою. Флакони з вакциною вміщені в пластикові коробки з лунками.
Розмір упаковки: 2 х 1 мл, 10 х 1 мл, 20 х 1 мл, 50 х 1 мл.
Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника
Акціонерне товариство «Біовета», 212 Коменского, 683 23 Івановіце на Гане, Чеська Республіка.
Додаткова інформація
Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

ЕВРОВЕТ