

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Пазорін-Оль, Pasorin-Ol – вакцина інактивована проти пастерельозу кролів.

Склад

Одна доза (1 мл) вакцини містить:

Діючі речовини (до інактивації):

Pasteurella multocida, серотип А

мін. $3,34 \times 10^9$ КУО, макс. $5,12 \times 10^9$ КУО

Pasteurella multocida, серотип AD

мін. $3,34 \times 10^9$ КУО, макс. $4,99 \times 10^9$ КУО

Pasteurella multocida, серотип D

мін. $3,34 \times 10^9$ КУО, макс. $4,87 \times 10^9$ КУО

Допоміжні речовини:

ад'ювант: олеїнова емульсія

до 1 мл

інактивант: розчин формальдегіду 35 %

макс. 0,1 мг

консервант: тіомерсал

0,0595-0,0805 мг

Фармацевтична форма

Емульсія.

Імунобіологічні властивості

Після введення вакцинного антигену в організм тварини, специфічні антитіла створюють захист імунізованих тварин проти пастерельозу.

Тварин вакцинують у віці від 4 тижнів. Стійкий імунітет розвивається і триває протягом 6 місяців.

Для підтримання імунітету тварин щеплюють щопівроку.

Вид тварин

Кролі.

Показання до застосування

Для профілактичної вакцинації кролів проти пастерельозу, починаючи з 4-тижневого віку.

Протипоказання

Не вакцинувати клінічно хворих тварин або тварин з ознаками хвороби.

Застереження при застосуванні

Перед застосуванням вміст флакону підігріти до кімнатної температури (15-25)°C та ретельно збовтати.

Взаємодія з іншими засобами

Відсутня.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Без обмежень.

Спосіб застосування та дози

Вакцину застосовують шляхом підшкірних ін'єкцій у наступних дозах:

кролі віком від 4 до 6 тижнів – 0,5 мл вакцини;

кролі віком від 7 тижнів і старше – 1 мл вакцини.

Рекомендована схема вакцинації:

1-ша вакцинація кролів у віці 4 тижні;

2-га вакцинація кролів у віці 7 тижнів;

3-тя вакцинація кролів у віці 10 тижнів (статевозрілі особини).

Для підтримання імунітету тварин ревакцинують однією дозою вакцини щопівроку.

У випадку першої вакцинації кролів старших зазначеного віку, щеплення проводять двічі з інтервалом 3 тижні. Для подальших регулярних вакцинацій кролів застосовують одну дозу вакцини щопівроку.

Побічні ефекти

Після введення вакцини у місці ін'єкції може утворитися припухлість діаметром 0,5-3 см. У деяких тварин може спостерігатись зниження апетиту, що триває протягом максимум 24-48 годин.

