

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Біокан Новел Purru, Biosan Novel Purru – вакцина жива проти чуми м'ясоїдних та парвовірозу собак.

Склад

Одна доза (1 мл) вакцини містить:

а) Ліофілізований компонент:

вірус чуми м'ясоїдних, штам CDV Bio 11/A

парвовірус тип 2b, штам CPV-2b Bio 12/B

– мін. $10^{4,1}$ ТЦІД₅₀ – макс. $10^{5,5}$ ТЦІД₅₀

– мін. $10^{5,5}$ ТЦІД₅₀ – макс. $10^{7,0}$ ТЦІД₅₀

б) Розчинник:

вода для ін'єкцій

– 1 мл

Допоміжні речовини:

живильне середовище для ліофілізації

– 0,3 мл

Фармацевтична форма

Ліофілізат і розчинник.

Імунобіологічні властивості

Вакцина формує стійкий імунітет проти вірусу чуми м'ясоїдних та парвовірусу. Імунітет розвивається у цуценят, які не мають материнських антитіл, протягом 14 днів після введення однієї дози та триває 12 місяців.

Вид тварин

Собаки.

Показання до застосування

Для активної вакцинації собак проти хвороб, викликаних вірусом чуми м'ясоїдних та парвовірусом типу 2a, 2b та 2c, починаючи з 6-тижневого віку.

Протипоказання

Загальні гіпертермічні захворювання.

Застереження при застосуванні

Імунологічні реакції на вакцину можуть виникати із запізненням через втручання материнських антитіл. У випадках, коли очікується дуже високий рівень материнських антитіл проти вірусу чуми м'ясоїдних та парвовірусу, потрібно провести подальшу вакцинацію вакцинами Біокан Новел, які також містять вірус чуми м'ясоїдних та парвовірус.

Вакцинувати можна лише клінічно здорових тварин.

Взаємодія з іншими засобами

Рішення про застосування цієї вакцини перед чи після застосування будь-якого іншого ветеринарного лікарського засобу має прийматися індивідуально у кожному окремому випадку.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Не вакцинувати тварин під час вагітності або лактації.

Спосіб застосування та дози

1 мл незалежно від маси та породи.

Метод застосування: підшкірно в область під лопатками.

Рекомендована схема вакцинації:

Базова вакцинація

Одна доза вакцини Біокан Новел Purru вводиться з 6-тижневого віку.

Ревакцинація

Щорічна ревакцинація однією дозою вакцини Біокан Новел Purru повинна проводитися у випадках, коли потрібна імунізація лише проти вірусу чуми м'ясоїдних та парвовірусу.

Через три тижні після вакцинації з Біокан Новел Purru слід проводити щеплення комбінованими вакцинами Біокан Новел, які також містять вірус чуми м'ясоїдних та парвовірус. Ревакцинацію

проти чуми м'ясоїдних і парвовірусу типу 2a, 2b, 2c слід проводити щорічно комбінованими вакцинами Біокан Новел.

Побічні ефекти

Не спостерігались. Як і при застосуванні інших вакцин, в дуже рідкісних випадках можуть виникати реакції гіперчутливості. В разі виникнення такої реакції, слід негайно надати відповідну медичну допомогу.

Період виведення (каренції)

Не призначено для продуктивних тварин.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП

У разі випадкової аутовакцинації слід негайно звернутися до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний ветеринарний лікарський засіб або його відходи повинні бути утилізовані відповідно до вимог місцевого чинного законодавства.

Термін придатності

2 роки. Розведену вакцину використати одразу.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморозувати!

Упаковка

Вакцина випускається у скляних флаконах, що закриті гумовими пробками та запаяні алюмінієвими кришками. Флакони з вакциною поміщені в прозорі пластикові коробки. У кожній коробці міститься затверджена листівка-вкладка.

Пластикові коробки з 10 лунками:

5 x 1 мл ліофілізованого компоненту + 5 x 1 мл розчинника

Пластикові коробки з 20 лунками:

10 x 1 мл ліофілізованого компоненту + 10 x 1 мл розчинника

Пластикові коробки з 50 лунками:

25 x 1 мл ліофілізованого компоненту + 25 x 1 мл розчинника

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Акціонерне товариство "Біовета", Коменського 212, 683 23, Іванівце на Гане, Чеська Республіка.

Правила відпуску

Без рецепта.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення реклаमाцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.