

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

БіоБос Респі 4, BioBos Respi 4 – вакцина інактивована проти респіраторно-синцитіальної інфекції, парагрипу-3, вірусної діареї та пастерельозу великої рогатої худоби.

Склад

Одна доза (2 мл) вакцини містить:

Активні діючі речовини:

вірус респіраторно-синцитіальної інфекції ВРХ, інактивований, штамп ВІО-24 $RP \geq 1^*$

вірус парагрипу-3 ВРХ, інактивований, штамп ВІО-23 $RP \geq 1^*$

вірус діареї ВРХ, інактивований, штамп ВІО-25 $RP \geq 1^*$

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, інактивована, штамп DSM 5283, серовар 1А $RP \geq 1^*$

*RP – відносна ефективність, визначена шляхом порівняння з еталонною сироваткою, отриманою після вакцинації мурчаків серією вакцини, яка успішно пройшла випробування на цільових видах тварин.

Допоміжні речовини:

ад'ювант: гідрооксид гідратного алюмінію 2 % – 0,4 мл

ад'ювант: сапонін Квілайї мильної (Quil A) 1 % – 0,04 мл

консервант: тіомерсал – 0,01 %

інактивант: розчин формальдегіду – $\leq 0,05$ %

Фармацевтична форма

Суспензія.

Імунобіологічні властивості

Вакцинація великої рогатої худоби викликає утворення специфічних антитіл проти вірусних та бактеріальних антигенів, що входять до складу вакцини (респіраторно-синцитіального вірусу ВРХ, вірусу парагрипу-3 ВРХ, вірусної діареї та бактерій *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*.

Стійкий імунітет розвивається через три тижні після основної вакцинації.

Вид тварин

Велика рогата худоба.

Показання до застосування

Для активної вакцинації великої рогатої худоби проти захворювань, викликаних респіраторно-синцитіальним вірусом ВРХ, вірусом парагрипу-3 ВРХ, вірусом діареї ВРХ та пастерелею.

Протипоказання

Не застосовувати при наявності гіперчутливості до діючої речовини, ад'юванту або до будь-якої з допоміжних речовин.

Наявні клінічні ознаки захворювання.

Застереження при застосуванні

У флаконі є осад, що зникає після струшування флакону з вакциною. Перед застосуванням довести вміст флакону до температури від 15 до 25°C та ретельно збовтати.

Взаємодія з іншими засобами

Інформація стосовно нешкідливості та ефективності застосування вакцини з іншими ветеринарними препаратами відсутня. Рішення щодо введення засобу з іншими ветеринарними препаратами приймає безпосередньо лікар ветеринарної медицини.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Без обмежень.

Спосіб застосування та дози

Вакцину застосовують підшкірно у дозі 2 мл на голову.

Основна вакцинація:

Тварин вакцинують двічі з інтервалом в 3 тижні.

Телят вакцинують, починаючи з 3 місяців. Телят від не вакцинованих корів вакцинують, починаючи з 2-тижневого віку.

Побічні ефекти

Після застосування вакцини можуть спостерігатися місцеві реакції, що тривають максимум 3 дні та супроводжуються тимчасовим підвищенням температури. Після введення вакцини у місці ін'єкції

може утворитися припухлість, яка зникає протягом 2-3 тижнів.

Період виведення (каренції)

Відсутній.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВПІ

Уникати аутовакцинації. У разі випадкового введення вакцини необхідно терміново звернутися до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВПІ, способи його знешкодження і утилізації

Будь-який невикористаний ветеринарний лікарський продукт або відходи, отримані від використання таких ветеринарних лікарських продуктів, слід утилізувати відповідно до місцевих вимог.

Термін придатності

2 роки. Вакцину з відкритого флакону використовують впродовж 10 годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати у сухому темному місці за температури від 2 до 8°C.

Упаковка

Вакцина випускається у скляних флаконах гідролітичного класу I: 10 мл флакони, що містять 10 мл (5 доз) вакцини; гідролітичного класу II: 50 мл флакони, що містять 50 мл (25 доз) вакцини, 100 мл флакони, що містять 100 мл (50 доз) вакцини; і у пластикових флаконах: 15 мл флакони, що містять 10 мл (5 доз) вакцини; 60 мл флакони, що містять 50 мл (25 доз) вакцини; 120 мл флакони, що містять 100 мл (50 доз) вакцини. Флакони з вакциною герметично закриті гумовою пробкою, придатною для проколювання, та запаяні алюмінієвою кришкою. Флакони з вакциною поміщені у пластикові або картонні коробки. У кожній коробці міститься затверджена листівка-вкладка.

Розмір упаковки:

- а) пластикові коробки з 10 лунками: 10 x 10 мл;
- б) картонні коробки: 1 x 10 мл, 1 x 50 мл, 1 x 100 мл, 10 x 10 мл.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Акціонерне товариство «Біовета», Коменського 212, 683 23, Івановіце на Гане, Чеська Республіка.

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2, три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.