

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Бі МПВ, Бі APV – вакцина жива ліофілізована проти метапневмовірусної інфекції птиці.

Склад

Вакцина містить:

живий атенуйований метапневмовірус птиці (APV), підтип А, штам VP20 $-10^{3.3}-10^{4.4}$ ТКІД₅₀/дозу

живий атенуйований метапневмовірус птиці (APV), підтип В, штам W4 $-10^{2.2}-10^{3.8}$ ТКІД₅₀/дозу

Допоміжні речовини:

стабілізатор:

СФГА-ЕДТК (сахароза, фосфат, глютамат, альбумін,
етилентендіамінтетрауксусна кислота)

– 1,5 г/флакон

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Вакцина забезпечує активний імунітет проти збудника метапневмовірусної інфекції, що викликає синдром набряклої голови курей. У щепленої птиці стійкий імунітет формується протягом 3 тижнів після ревакцинації і зберігається не менше 6 тижнів.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для профілактичної вакцинації яєчної птиці, племінного поголів'я бройлерів та курей-несучок проти метапневмовірусної інфекції, починаючи з 1 тижня життя.

Протипоказання

Відсутні.

Застереження при застосуванні

Вакцинувати тільки здорову птицю. Не змішувати з іншими ветеринарними імунобіологічними засобами.

Взаємодія з іншими засобами

Інформація стосовно нешкідливості та ефективності застосування вакцини з іншими ветеринарними препаратами відсутня. Рішення щодо введення засобу з іншими ветеринарними препаратами приймає безпосередньо лікар ветеринарної медицини.

Особливі вказівки при несучості

Не застосовувати за 4 тижні до початку та під час несучості.

Спосіб застосування та дози

Птицю вакцинують, починаючи з 1 тижня життя методом випоювання, спрей-методом та інтраокулярним методом з подальшою ревакцинацією через 2 тижні.

Метод випоювання

За 48 годин до вакцинації слід завершити будь-яку очистку води.

Вакцину розчинити в 1/5 денного об'єму питної води таким чином, щоб об'єм вакцини, що вводиться одній птиці (5 мл), містив вірус у кількості еквівалентній 1 рекомендованій для вакцинації дозі та випоїти птиці. Необхідну кількість вакцини рекомендується розчинити в 1/5 денного об'єму питної води. Точна кількість води визначається залежно від типу та ваги птиці, часу доби та погодних умов. Воду з вакциною птиця повинна випити протягом 2 годин. Для нейтралізації хлору у питній воді застосовується промисловий нейтралізатор хлору згідно з інструкцією або додавання на 1 води 50 мл знежиреного молока або 5 г порошку знежиреного молока. Після розчинення молока необхідно почекати 5 хвилин, а потім додати вакцину. Для контролю вакцинованої птиці бажано додати синій барвник у вакцинний розчин. Слід припинити подачу води птиці за 1-2 години до застосування вакцини влітку або за 3-4 години взимку.

Переконайтесь, що вся птиця має доступ до води, забезпечивши достатню кількість поїлок (для молодої птиці) та ніпелів або чашок (для старшої птиці). Опустіть водопровід і дайте птиці пити.

Спрей-метод

Спрей-метод застосовується курчатам на 1 тиждні життя та в інкубаторі. Для розпилення вакцини використовується автоматичний розпилювач, який спрацьовує, коли ящик з курчатами їде по ланцюгу. Також можна застосовувати розпилювач з ручним керуванням. Діаметр крапель повинен бути приблизно 150-200 μ . В результаті розпилення птахи повинні бути повністю змочені. Спрей-методом розчин потрапляє в очі і рот птахів. Птахи збирають краплі також з пір'я інших птахів, що дозволяє вакцині потрапити і в горло. 20-30 мл води має містити 100 доз вакцини, яких вистачає на ящик із 100 курчат.

Пам'ятка перед проведенням вакцинації спрей-методом в інкубаторі:

Переконайтесь, що обладнання є чистим, без залишків дезінфектантів і в справному стані.

Переконайтесь, що температура води становить 6-10°C. На кожні 1000 доз потрібно 250-300 мл води. Відкалібруйте автоматичний розпилювач (або розпилювач з ручним керуванням) для розпилення крапель розміром 150-200 μ в об'ємі 25-30 мл. Додайте блакитний барвник. Протестуйте систему на пустій коробці, щоб переконавшись в правильному розмірі крапель і рівномірному покритті коробки.

Підготовка:

Помістіть достатню кількість ліофілізату в ємкість з водою і чекайте його повного розчинення. Налийте розчинену вакцину в резервуар для води розпилювача і обережно розмішайте.

Застосування:

Поповнюйте розчин з вакциною кожні 1,5-2 години. Стежте за роботою випускного отвору. Стежте за температурою води (6-10°C).

Перевірка

Перевірте якість вакцинації за наявністю блакитного барвника на пір'ї птахів та проведіть по них рукою, щоб переконавшись, що птахи повністю змочені.

Після розпилення тримайте птахів, поки вони ще мокрі, в закритому, добре прогрітому приміщенні подалі від протягів.

Інтраокулярний метод

Таблетку необхідно розчинити в холодній кип'яченій воді або фізіологічному розчині – 1000 доз вакцини розчиняють в 30-50 мл розчинника (точна кількість залежить від типу застосованої крапельниці). У вакцинний розчин бажано додати барвник для контролю вакцинації.

Тримавши птаха в одній руці, підставити його під крапельницю, щоб в око (ніздрю) потрапила одна крапля.

Побічні ефекти

Відсутні.

Період виведення (каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

Дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами. Після проведення вакцинації ретельно вимити руки з милом та застосувати дезінфектант для рук.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний і протермінований препарат або використані порожні флакони повинні бути утилізовані згідно місцевих вимог.

Термін придатності

24 місяці. Розчинену вакцину необхідно використати протягом 2 годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому темному місці за температури від 2°C до 8°C. Не заморожувати!

Упаковка

Вакцина випускається у скляних флаконах, що містять 500, 1000, 2000, 3000 або 5000 доз вакцини. Флакони з вакциною вкриті гумовим корком, придатним для проколювання, та герметично вкриті

алюмінієвими кришками. Флакони з вакциною поміщені в картонну коробку. На кожній упаковці прикріплена затверджена етикетка.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

АБІК Біолоджикал Лабораторіз Лтд., вул.Хамелача 3, Вест Індастріал Зоун, Бейт-Шемеш 9905503, Ізраїль.

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ