

Листівка-вкладка
МОКСАМІД спот-он розчин для котів
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)

Опис

Прозорий безбарвний або жовтуватий розчин.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

імідаклоприд – 100 мг;

моксидектин – 10 мг.

Допоміжні речовини: бутилгідроксітолуен (Е 321), спирт бензиловий (Е 1519), пропілен карбонат.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QP54, ендектоциди (QP54AB52 – моксидектин, комбінації).

Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючої речовини.

Імідаклоприд, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид групи хлорнікотинілових сполук. Ефективний проти личинок та зрілих особин бліх. Личинки бліх гинуть після контакту з обробленими імідаклопридом тваринами. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках ЦНС бліх. Пригнічення холінергічної нейротрансмісії в організмі паразиту призводить до його паралічу та загибелі. Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців зумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд майже не впливає на ЦНС ссавців. Має мінімальну фармакологічну активність у ссавців. Після зовнішнього застосування поширюється по всій поверхні тіла тварини впродовж доби.

Моксидектин, 23-(O-methyloxime)-F28249 альфа, належить до другого покоління макроциклічних лактонів із групи мільбеміцинів. Це паразитицид, який діє проти багатьох ендо- та екто- паразитів. Активний проти личинок *Dirofilaria immitis* (стадії L3, L4) та проти гастроінтестинальних нематод. Взаємодіє з гама-аміно-масляною кислотою (ГАМК) та з глутаровими хлорними каналцями паразитів, що призводить до відкриття хлорних каналців у постсинаптичному просторі. Збільшення кількості іонів хлору незворотно знижує м'язову активність, паралізує та вбиває паразитів. Має стійку дію, після одноразового застосування захищає котів від повторного зараження *Dirofilaria immitis* впродовж 4 тижнів.

Всмоктується через шкіру й розповсюджується системно, досягаючи максимальної концентрації в плазмі крові через 1-2 доби після лікування котів. Виводиться з організму повільно протягом 1 місяця. Середній $t_{1/2}$ у котів коливається від 18,7 до 25,7 днів. Після багаторазового застосування стабільний рівень у сироватці крові досягається після приблизно 4 послідовних місячних обробок котів.

Застосування

Лікування та профілактика котів при змішаних паразитарних інвазіях:

- лікування та профілактика при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*);
- лікування отодектозу (*Otodectes cynotis*) та нотоєдрозу (*Notoedres cati*);
- лікування легеневих гельмінтів *Eucoleus aerophilus* (син. *Capillaria aerophila*) (дорослі стадії);
- профілактика аелуроостронгілозу (стадії L3/L4 личинок *Aelurostrongylus abstrusus*);
- лікування аелуроостронгілозу *Aelurostrongylus abstrusus* (дорослі стадії);
- лікування нематодозів очей *Thelazia callipaeda* (дорослі стадії);
- профілактика диروفіляріозу (стадії L3 і L4 личинок *Dirofilaria immitis*);
- лікування інфекцій, викликаних гастроінтестинальними нематодами (личинки стадії L4, незрілі імаго та імаго *Toxocara cati* та *Ancylostoma tubaeforme*).

02.12.2025

Препарат може використовуватись як один із засобів під час лікування блошиного алергічного дерматиту (БАД).

Лікування та профілактика тхорів при змішаних паразитарних інвазіях:

- лікування та профілактика при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*);
- профілактика дирофіляріозу (стадії L3 і L4 личинок *Dirofilaria immitis*).

Дозування

Лише для зовнішнього точкового застосування.

Коти:

Рекомендована мінімальна доза – 0,1 мл/кг маси тіла препарату МОКСАМІД для котів (що відповідає 10 мг/кг маси тіла імідаклоприду та 1,0 мг/кг маси тіла моксидектину).

Схема лікування має базуватися на індивідуальному діагнозі та місцевій епідеміологічній ситуації.

Маса тіла кота (кг)	Розмір упакування для застосування	Об'єм (мл)	Імідаклоприд (мг/кг м.т.)	Моксидектин (мг/кг м.т.)
≤ 4 кг	МОКСАМІД для малих котів і тхорів	0,4	мінімум 10	мінімум 1
> 4–8 кг	МОКСАМІД для великих котів	0,8	10-20	1-2
> 8 кг	Відповідна комбінація туб			

Лікування та профілактика при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*)

Одна обробка запобігає зараженню блохами протягом 4 тижнів. Для прискорення зменшення популяції домашніх бліх слід поєднати обробку тварини з обробкою навколишнього середовища, щоб перервати цикл розвитку бліх, адже їхні лялечки можуть вилупитися в середовищі через 6 тижнів або пізніше від початку лікування. У разі лікування алергічного блошиного дерматиту препарат слід застосовувати з місячним інтервалом.

Лікування отодектозу (*Otodectes cynotis*)

Нанесіть одну дозу препарату. Через 30 днів рекомендується здійснити ветеринарний огляд, оскільки деяким тваринам потрібне повторне нанесення препарату. Не наносити безпосередньо у вушний канал.

Лікування нотоєдрозу (*Notoedres cati*)

Нанесіть одну дозу препарату.

Лікування легеневих гельмінтів *Eucoleus aerophilus* (син. *Capillaria aerophila*) (дорослі стадії)

Нанесіть одну дозу препарату.

Профілактика аелуроостронгільозу *Aelurostrongylus abstrusus*

Необхідне щомісячне застосування.

Лікування аелуроостронгільозу *Aelurostrongylus abstrusus*

Необхідне щомісячне застосування протягом трьох місяців поспіль.

Лікування нематодозів очей гельмінтами *Thelazia callipaeda* (дорослі стадії)

Нанесіть одну дозу препарату.

Профілактика зараження дирофіляріозом (*Dirofilaria immitis*)

02.12.2025

Перед застосуванням ознайомтеся з Особливими застереженнями при використанні, оскільки коти, що живуть чи відвідували ендемічні щодо дирофілярій зони, можуть бути інфіковані дорослими дирофіляріями.

Препарат слід застосовувати 1 раз на місяць у період активності комарів (проміжного господаря личинок дирофілярій). Дозволене застосування протягом року. Першу дозу можна наносити після першого можливого контакту з комарами, але не пізніше, ніж через 1 місяць після нього. Обробку слід продовжувати з регулярними місячними інтервалами до 1 місяця після останнього контакту з комарами. Наносити щомісяця в один і той самий день або в одну дату для забезпечення регулярного лікування. У разі застосування МОКСАМІДУ замість іншого препарату із профілактичною дією проти серцевих гельмінтів, його необхідно нанести протягом 1 місяця після останньої дози попереднього препарату.

У зонах, в яких не зустрічається поширення дирофіляріозу, препарат можна застосовувати без спеціальних заходів.

Лікування інфекцій, викликаних гастроінтестинальними нематодами (аскаридами та анкілостомами) (Toxocara cati та Ancylostoma tubaeforme)

У зонах, де поширений дирофіляріоз, щомісячне лікування може значно знизити ризик повторного зараження аскаридами та анкілостомами. У місцях, де дирофілярії відсутні, препарат можна використовувати як частину профілактичної програми проти бліх і гастроінтестинальних нематод.

Тхори:

На одну тварину наносять 1 тубу препарату МОКСАМІД фасуванням для малих котів (0,4 мл). Не перевищувати рекомендовану дозу. Схема лікування повинна ґрунтуватися на місцевій епідеміологічній ситуації.

Лікування та профілактика при ураженні блохами (Ctenocephalides felis)

Одна обробка запобігає зараженню блохами протягом 3 тижнів. У разі сильного зараження блохами може знадобитися повторна обробка через 2 тижні.

Профілактика зараження дирофіляріозом (Dirofilaria immitis)

Перед застосуванням ознайомтеся з Особливими застереженнями при використанні, оскільки тхори, що живуть чи відвідували ендемічні щодо дирофілярій зони, можуть бути інфіковані дорослими дирофіляріями.

Препарат слід наносити з регулярними місячними інтервалами в період активності комарів (проміжного господаря личинок дирофілярій). Дозволене застосування протягом року. Першу дозу можна наносити після першого можливого контакту з комарами, але не пізніше, ніж через 1 місяць після нього. Обробку слід продовжувати з регулярними місячними інтервалами до 1 місяця після останнього контакту з комарами. У зонах, в яких не зустрічається поширення дирофіляріозу, препарат можна застосовувати без спеціальних заходів.

Спосіб застосування

Тримайте тубу шийкою вгору і кілька разів постукайте пальцем по шийці. Обережно відламайте кінчик обертальними рухами.

Розділіть шерсть на шії тварини біля основи черепа, щоб було видно шкіру. Розмістіть кінчик туби на шкіру, міцно стиснувши тубу кілька разів, нанесіть увесь вміст безпосередньо лише на неушкоджену ділянку шкіри. Нанесення на основу черепа мінімізує ризик злизування продукту твариною.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-яких діючих та допоміжних речовин препарату.

Не застосовувати кошенятам віком до 9 тижнів.

02.12.2025

Не застосовувати тхорам препарат МОКСАМІД для котів фасуванням для великих котів (0,8 мл) або препарат МОКСАМІД для собак.

Не застосовувати канаркам.

Не застосовувати собакам, натомість використовувати відповідний препарат МОКСАМІД для собак.

Застереження

Побічна дія

У котів рідко можуть спостерігатися такі симптоми, як засалювання шкіри, блювота, еритема, що зникають без лікування. Дуже рідко виникають місцева алергічна реакція і тимчасова зміна в поведінці (млявість, неспокій, втрата апетиту). У разі випадкового злизування препарату відразу після нанесення дуже рідко виникають неврологічні ознаки, більшість з яких тимчасові. Можливе виникнення короточасного свербіжу. Після випадкового злизування препарату відразу після його нанесення може підвищитися слиновиділення, яке зникає через кілька хвилин без лікування (це не ознака отруєння).

Особливі застереження при використанні

Не наносити в рот, очі чи вуха тварини та уникати проковтування та потрапляння препарату в очі та рот тваринам-пацієнтам та/чи іншим тваринам.

Лікування котів масою менше 1 кг, тхорів масою менше 0,8 кг та хворих й ослаблених тварин повинно ґрунтуватися на оцінці користь-ризик.

Важливо обрати правильний метод нанесення препарату та враховувати, що його слід наносити на вказану ділянку, щоб звести до мінімуму ризик злизування препарату твариною. Не допускайте тварин після обробки до догляду одне за одним. Обмежте контакт оброблених тварин з необробленими, поки місце нанесення препарату не висохне.

Рекомендується щомісячно обробляти препаратом котів і тхорів, які живуть або подорожують до ендемічних щодо дирофіляріозу територій.

Перед початком профілактичного лікування рекомендується перевірити всіх котів і тхорів віком від 6 місяців на наявність серцевих гельмінтів, оскільки застосування препарату тваринам, у яких наявні серцеві гельмінти дорослих стадій, може спричинити серйозні несприятливі наслідки, зокрема, й смерть. Якщо діагностовано зараження дорослими стадіями серцевих гельмінтів, інфекцію слід лікувати відповідно до сучасних наукових рекомендацій.

За наявності тяжкої стадії зараження *Notoedres cati* у деяких котів необхідне супутнє підтримуюче лікування, оскільки препарату може бути недостатньо для запобігання смерті тварини.

Імідаклоприд токсичний для птахів, особливо канарок.

Розчинник, що міститься у ветеринарному препараті, може забарвити чи пошкодити певні матеріали, зокрема, шкіру, тканини, пластмаси та поліровані поверхні. Перед контактом з ними слід зачекати, поки місце нанесення висохне.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Препарат не рекомендується застосовувати тваринам, призначеним для розведення, а також під час вагітності та лактації.

Період виведення (каденції)

Для непродуктивних тварин не визначається.

Форма випуску

Прозора однодозова туба об'ємом 2 мл, виготовлена з поліетилену (суміш поліетилену: 70% поліетилену високої щільності / 30% поліетилену низької щільності) з відламуваним наконечником (із поліетилену низької щільності). Кожна туба запечатана в пакет (PET-Al-PE), поміщений у картонну коробку.

Розмір пакування: 1) 0,4 мл в одній тубі; 2) 0,8 мл в одній тубі.

У кожній коробці 1 або 3 однодозові туби.

Зберігання

02.12.2025

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту:

Біовета, а.с.,
Коменского 212,
683 23 Івановіце на Гане,
Чехія

Bioveta, a.s.
Komenskeho 212
683 23 Ivanovice na Hane
Czech Republic