

Стафак® 110
(порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Порошок зелено-коричневого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

вірджиніаміцин – 0,11 г.

Допоміжні речовини: натрію карбоксиметилцелюлоза, олія мінеральна, кальцію карбонат, деіонізована вода.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QD06AX10 – Вірджиніаміцин.

Вірджиніаміцин належить до антибактеріальних препаратів групи стрептограмінів. Він діє бактеріостатично проти грампозитивних (*Clostridium perfringens*, *Staphylococcus spp.*, *Micrococcus spp.*, *Listeria spp.*) та деяких грамнегативних (*Campylobacter spp.*) мікроорганізмів. Вірджиніаміцин складається з двох компонентів – фракція М (72 %) і фракція S (28 %).

Механізм дії вірджиніаміцину полягає у гальмуванні синтезу білка в клітинах чутливих мікроорганізмів, порушуючи трансляцію РНК. Зв'язування стрептограмінів з 50S-субодиницею можливе на будь-якій стадії рибосомального циклу. У результаті відбувається гальмування процесу формування та нарощування пептидного ланцюга, що призводить до загибелі клітини.

За перорального застосування вірджиніаміцин не всмоктується і його антибактеріальна дія обмежується виключно травним каналом. У травному каналі він не зазнає впливу травних ферментів, завдяки чому досягається його висока концентрація, що сприяє тривалій антибактеріальній дії в кишечнику.

Вірджиніаміцин не накопичується в органах і тканинах. Концентрації вірджиніаміцину у плазмі крові відсутні. Вірджиніаміцин інтенсивно метаболізується і з організму виводиться в незміненому вигляді з фекаліями.

Застосування

Метафілактика та лікування курчат-бройлерів, хворих на некротичний ентерит, що спричинений *Clostridium perfringens*, чутливою до вірджиніаміцину.

За застосування препарату для метафілактики перед його використанням необхідно встановити наявність захворювання в групі тварин.

Дозування

Перорально:

метафілактика – у дозі 180-200 г препарату на 1000 кг готового корму (20-22 г вірджиніаміцину на 1000 кг готового корму) або 1,7-2,8 мг препарату на 1 кг маси тіла щодобово протягом 5-7 діб.

лікування – у дозі 80 мг вірджиніаміцину на 1 кг корму або 727 г препарату на 1000 кг готового корму (що відповідає приблизно 8 мг вірджиніаміцину/кг маси тіла) протягом 14 діб..

Протипоказання

Підвищена чутливість до вірджиніаміцину.

Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких використовують для споживання людям.

Застереження

Побічна дія

За дотриманням рекомендацій, зазначених виробником, побічної дії не спостерігали.

Особливі застереження при використанні

Перед застосуванням препарату необхідно провести тест на чутливість мікроорганізмів-збудників до вірджиніаміцину.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких використовують для споживання людям.

Не рекомендують застосовувати племінній птиці.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Дозволяється застосування препарату одночасно з іншими антибактеріальними засобами, а також одночасно з кокцидіостатиками та нестероїдними протизапальними засобами.

Період виведення (каренції)

М'ясо – 0 діб.

Форма випуску

Паперові пакети з пароізоляційним поліетиленовим бар'єром по 25 кг.

Зберігання

Сухе, темне, не доступне для дітей місце за температури від мінус 25 до 25°C

Термін придатності – 3 роки.

Після першого відкриття упаковки препарат застосовують протягом 6 місяців за умови зберігання у сухому, темному місці за температури від мінус 25 до 25 °C.

Корм з препаратом використовують протягом 3 місяців.

Для застосування у ветеринарній медицині!**Власник реєстраційного посвідчення**

Файбро Енімал Хелс Корпорейшн

Гленпоінт Сентер Іст, поверх 3

300 Френк В. Бер Блvd., офіс 21

Тінек, Нью Джерсі, 07666-6712, США

Phibro Animal Health Corporation

Glenpointe Centre East, Floor 3

300 Frank W. Burr Blvd., Suite 21

Teaneck, New Jersey, 07666-6712, USA

Виробники готового продукту

Рідлі ЮЕсЕй, Інк.

1609 1-ша Авеню

Мендота, Іллінойс

61342-1366, США

Ridley USA, Inc.

1609 1st Avenue

Mendota, Illinois

61342-1366, USA

Фібро Сауде Анімал Інтернаціональ Лтда.,

Авеніда Президенте. Танкредо ді Альмейда

Невіс No 1063

Маседу, Гуарульюс, Сан-Паулу,

07.112-070, Бразилія

Phibro Saúde Animal Internacional Ltda.,

Avenida Presidente. Tancredo de Almeida

Neves No 1063

Macedo, Guarulhos-São Paulo,

07.112-070, Brazil