

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Біокан L, Biocan L – вакцина інактивована проти лептоспірозу собак.

Склад

Одна доза (1 мл) вакцини містить:

Активні речовини:

Leptospira icterohaemorrhagiae інактивована

мін. титр 32 за РМА*

Leptospira canicola інактивована

мін. титр 32 за РМА*

Leptospira grippotyphosa інактивована

мін. титр 32 за РМА*

* середнє геометричне значення титрів специфічних антитіл, визначених шляхом реакції мікроаглютинації

Допоміжні речовини:

ад'ювант: гідроксид алюмінію

1,8-2,2 мг

живильне середовище для культивування лептоспир.

Фармацевтична форма

Суспензія.

Імунобіологічні властивості

Вакцина формує активний імунітет проти найбільш поширених сероварів лептоспир: *L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, *L. grippotyphosa*. Стійкий імунітет формується через 14 днів після основної вакцинації. Для підтримання імунітету рекомендується щорічна ревакцинація.

Вид тварин

Собаки.

Показання до застосування

Для активної імунізації проти найбільш розповсюджених сероварів лептоспир у собак віком від 8 тижнів.

Протипоказання

Загальні гіпертермічні захворювання.

Застереження при застосуванні

Перед застосуванням флакон з вакциною у підігріти до кімнатної температури (15-25)°C та ретельно збовтати.

Вакцинувати можна лише клінічно здорових тварин з хорошим ступенем вгодованості. Дегельмінтизацію слід проводити мінімум за 10 днів до вакцинації. Вакцинованих тварин не слід тренувати або піддавати фізичним навантаженням протягом одного тижня після вакцинації.

Взаємодія з іншими засобами

Вакцину можна застосовувати окремо або одночасно з іншими вакцинами лінійки Біокан:

А) Вакцину можна застосовувати в якості розчинника для інших ліофілізованих вакцин Біокан (наприклад, Біокан DHPi).

Б) Вакцину можна застосовувати одночасно з рідкими вакцинами лінійки Біокан (Біокан С, Біокан М, Біокан R) в різні місця.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Не вакцинувати протягом останніх 2 тижнів вагітності.

Спосіб застосування та дози

Тварин вакцинують у дозі 1 мл незалежно від маси та породи методом підшкірних ін'єкцій.

Основна вакцинація: одна доза вакцини – у віці від 8 тижнів, друга доза вакцини – через 14-28 днів таким чином, щоб вакцинація була зроблена у віці мінімум 12 тижнів.

Ревакцинація проводиться щорічно.

Для собак, які перебувають на території, зараженій ендемічними лептоспірами, або якщо не можна уникнути контакту собаки з водою (плавання, пиття), тобто при підозрі на високий ризик інфікування, може бути рекомендована ревакцинація через 6 місяців після основної вакцинації.

Побічні ефекти

У місці застосування вакцини можуть з'явитися місцеві реакції (розміром з горошину), які

зникають самі по собі протягом 3 тижнів. У рідких випадках можуть спостерігатися алергічні реакції.

Період виведення (каренції)

Не призначено для продуктивних тварин.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП

Дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Будь-який невикористаний ветеринарний лікарський продукт або відходи, отримані від використання таких ветеринарних лікарських продуктів, слід утилізувати відповідно до місцевих вимог.

Термін придатності

2 роки. Вакцину з відкритого флакону необхідно використати одразу.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому темному місці за температури від 2°C до 8°C. Не заморожувати!

Упаковка

Пластикові коробки з 10 лунками: 10 x 1 мл вакцини Біокан L

Пластикові коробки з 20 лунками: 20 x 1 мл вакцини Біокан L

Пластикові коробки зі 50 лунками: 50 x 1 мл вакцини Біокан L

Пластикові коробки зі 100 лунками 100 x 1 мл вакцини Біокан L

Правила відпуску

За рецептом.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Акціонерне товариство «Біовета», Коменского 212, 683 23 Івановіце на Гане, Чеська Республіка.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.