

10.10.2016

Лецирелін
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий, безбарвний розчин.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

лецирелін - 0,025 мг

Допоміжні речовини: натрію хлорид, динатрію гідрогенфосфат, хлорбутанолу гемігідрат, кислота ацетилова, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

АТС-вет код: QH - ветеринарні препарати гормонів для системного застосування; (QH01 - гормони гіпофізу та гіпоталамусу; QH01CA - гонадотропін-релізінг гормони; QH01CA92 - лецирелін.

Діюча речовина є синтетичним аналогом гонадотропін-релізінг гормону (ГнРГ), який викликає секрецію лютеїнізуючого гормону (ЛГ) з аденогіпофізу. ЛГ сприяє розвитку та овуляції фолікулів в яєчниках корів.

Після внутрішньом'язового введення лецирелін швидко всмоктується з місця ін'єкції. Період напіввивільнення складає декілька хвилин. Протягом 24 годин метаболізує в організмі тварини та швидко виводиться з сечею у вигляді неактивних пептидів та амінокислот.

Застосування

Регуляція статевої функції у корів: індукція овуляції, синхронізація еструсу, підвищення запліднюваності, лікування ациклічної тічки та оваріальних кіст.

Дозування

Внутрішньом'язово одноразово у наступних дозах:

- для індукції овуляції, синхронізації еструсу, підвищення запліднюваності, лікування ациклічної тічки ~ 2 мл препарату (еквівалентно 50 мкг діючої речовини) на тварину;

- для лікування оваріальних кіст - 4 мл (еквівалентно 100 мкг діючої речовини) препарату на тварину.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не застосовувати під час вагітності.

Застереження

Обмежень щодо споживання продукції тваринного походження після застосування препарату немає.

Форма випуску

Скляні ампули ємкістю 2 мл. Ампули з препаратом поміщені у картонну коробку, по 10 ампул у кожній коробці.

Скляні флакони, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 10 мл. Флакони з препаратом поміщені у картонну коробку, по 1 або 10 флаконів в кожній коробці.

Зберігання

Суше, темне місце при температурі від 0 до 25°C.

Термін придатності

2 роки. Після відкриття ампули препарат необхідно використати одразу. Після відкриття флакону 10 мл, за дотримання асептики, препарат можна використовувати протягом 28 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника

Біовета а.с.
Коменского 212
683 23 Івановіце на Гане
Чеська республіка

Bioveta, a.s.
Komenskeho 212
683 23 Ivanovice na Hane
Czech Republic