

Коротка характеристика препарату

1. Назва ветеринарного препарату

Біосуйс ПарвоЕрі Л (7), Biosuis ParvoEry L (7) – вакцина інактивована проти парвовірозу, бешихи та лептоспірозу свиней.

2. Якісний і кількісний склад

Одна доза (2 мл) вакцини містить:

Активні діючі речовини:

парвовірус інактивований, CAMP V198, штам S-27

Erysipelothrix rhusiopathiae, штам 2-64, серотип 2

Leptospira Bratislava

Leptospira Pomona

Leptospira Copenhageni

Leptospira Tarassovi

Leptospira Grippotyphosa

мін. титр $4 \log_2$ у РГГА*

RP ≥ 1

≥ 100 EU**

≥ 100 EU**

≥ 100 EU**

≥ 100 EU**

≥ 100 EU**

* титр антитіл до парвовірусу свиней, виявлених у мурчаків в РГГА після введення $\frac{1}{4}$ дози

**одиниці ELISA в in-vitro дослідженні ефективності

Допоміжні речовини:

інактивант: формальдегід 35 %

консервант: тіомерсал

адювант: алюмінію гідроксид

макс. 1,0 мг

0,2 мг

9 мг

3. Фармацевтична форма

Суспензія.

4. Імунобіологічні властивості

Після введення вакцина викликає формування специфічних антитіл в організмі тварин проти бешихи та специфічних антитіл проти парвовірозу та лептоспірозу, які захищають організм самки, а також її ембріони.

Вакцинація хряків попереджає реплікацію парвовірусу та лептоспір у сім'яниках та зменшує ризик передачі інфекції під час парування.

Після основного курсу вакцинації у тварин розвивається стійкий імунітет через 21 добу і триває протягом щонайменше 6 місяців після останньої вакцинації.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Свині.

5.2. Показання до застосування

Для активної вакцинації свиноматок, ремонтних свинок та хряків проти парвовірозу, бешихи та лептоспірозу.

5.3. Протипоказання

Не вакцинувати тварин з клінічними ознаками хвороби.

5.4. Побічна дія

Після вакцинації у тварин дуже часто спостерігається незначне підвищення температури, що зберігається щонайдовше 4 доби після вакцинації. В місці ін'єкції може виникнути місцева реакція, яка зникає впродовж 6-7 діб після вакцинації. Дуже рідко у тварин, чутливих до інфекції бешихи, можуть виникнути алергічні реакції.

5.5. Особливості застереження при використанні

Протягом тривалого зберігання вакцини в непорушному стані розчин вакцини розділяється на прозору рідину та осад від білого до сіруватого кольору. Перед застосуванням флакон з вакциною нагріти до кімнатної температури (15-25)°C та ретельно збовтати.

5.6 Застосування під час вагітності, лактації

Без обмежень.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Інформація стосовно нешкідливості та ефективності застосування вакцини з іншими ветеринарними препаратами відсутня. Рішення щодо введення засобу з іншими ветеринарними препаратами приймає безпосередньо лікар ветеринарної медицини.

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Вакцину застосовують у дозі 2 мл шляхом внутрішньом'язових ін'єкцій у область шиї за вушною раковиною.

Свиноматки та ремонтні свинки:

Основна вакцинація:

Одна доза вакцини вводиться за 6 тижнів до парування, друга доза вакцини – за 3 тижні до парування.

Ревакцинація проводиться однією дозою за 3 тижні до парування, але не пізніше, ніж через 6 місяців після попередньої вакцинації.

Хряки:

Основна вакцинація:

Одна доза вакцини вводиться за 6 тижнів до першого парування або збору сперми, друга доза вакцини – за 3 тижні до першого парування або залучення хряка до штучного осіменіння.

Ревакцинація проводиться однією дозою кожні 6 місяців.

5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Застосування двократної дози внутрішньом'язово було безпечним для свиней.

5.10. Спеціальні застереження

Вакцинувати тільки клінічного здорових тварин. Дотримуватись загальних умов асептики під час вакцинації.

5.11. Період виведення (каренції)

Нуль діб.

5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тваринам

Уникати аутовакцинації. У разі випадкового введення вакцини необхідно терміново звернутися до лікаря.

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Основні форми несумісності

Не змішувати з іншими ветеринарними препаратами в одній ін'єкції.

6.2. Термін придатності

2 роки. Вакцину з відкритого флакону використати впродовж 10 годин.

6.3. Особливі застереження щодо зберігання

Зберігати в сухому темному місці за температури від 2°C до 8°C. Не заморожувати!

6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування

Вакцина випускається у скляних флаконах. Флакони з вакциною, що вкриті гумовим корком, придатним для проколювання, та закриті алюмінієвою кришкою або кришкою типу «фліп-офф», поміщені у пластикові або картонні коробки. У кожній коробці міститься затверджена листівка-вкладка.

Розміри упаковки:

а) пластикові коробки: 10 x 10 мл

б) картонні коробки: 1 x 10 мл, 1 x 50 мл, 1 x 100 мл, 1 x 250 мл.

6.5. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Акціонерне товариство «Біовета», Коменського 212, 683 23, Івановіце на Гане, Чеська Республіка.

6.6. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом

Невикористаний ветеринарний препарат або порожні флакони повинні бути утилізовані відповідно до місцевих вимог.

6.7. Правила відпуску

За рецептом.

7. Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.