

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

СЗН+НХ+ІБК, EDS+NDV+ІВ – вакцина інактивована масляна емульгована проти синдрому зниження несучості, ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей.

Склад

Одна доза (0,5 мл) містить:

Активні речовини:

вірус синдрому зниження несучості, штам 127

– 400 ГАО

вірус ньюкаслської хвороби, штам V.H.

– $3,16 \times 10^8$ ЕД₅₀

вірус інфекційного бронхіту, штам М-41

– $10^{6,7}$ ЕД₅₀

Допоміжні речовини:

ад'ювант: парафін рідкий

– 0,32 мл

емульгатор: олеат сорбіту

– 0,030 мл

емульгатор: полісорбат 80

– 0,005 мл

Фармацевтична форма

Водно-масляна емульсія.

Імунобіологічні властивості

Вакцина формує стійкий імунітет проти синдрому зниження несучості, ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей. Імунітет зберігається протягом періоду продуктивності.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для профілактичної вакцинації яєчної птиці, батьківського поголів'я бройлерів та курей-несучок проти синдрому зниження несучості, ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Не вакцинувати хворих курей.

Застереження при застосуванні

Перед застосуванням підігріти вміст флакону до кімнатної температури (15-25)°С та ретельно збовтати. Обладнання для вакцинації необхідно попередньо очистити і стерилізувати.

Взаємодія з іншими засобами

Не відома.

Особливі вказівки при несучості

Не застосовувати.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням підігріти вміст флакону до кімнатної температури (15-25)°С та ретельно збовтати.

Вакцину застосовують у дозі 0,5 мл/гол. шляхом підшкірних або внутрішньом'язових ін'єкцій не пізніше, ніж за 4 тижні до початку періоду несучості.

Побічні ефекти

Відсутні.

Період виведення (каренції)

Не вакцинувати за 21 день до забою.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами.

Уникати аутовакцинації. У разі випадкового введення вакцини необхідно терміново звернутися до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00026-02-14
від 11.10.2019

Невикористаний і протермінований препарат або використані порожні флакони повинні бути утилізовані згідно місцевих вимог.

Термін придатності

24 місяці. Вакцину з відкритого флакону використати протягом 24 годин.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати!

Упаковка

Вакцина випускається у пластикових флаконах ємністю 250 мл, що містять 500 доз, або 500 мл, що містять 1000 доз. Флакони з вакциною закриті гумовим корком, придатним для проколювання, та герметично завальцьовані алюмінієвими кришками.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

АБІК Біолоджикал Лабораторіз Лтд., а/с 489, Вестерн Індастріал Зоун, Бейт Шемеш, 99100, Ізраїль.

Правила відпуску

За рецептом.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2, три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.